


予防接種に関する注意



異なるワクチンの接種間隔

予防接種を受けた翌日から数え始めます。



<<注意>>

- 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹などの症状が出ることがあります。規定上接種が可能な期間であっても、必ず発熱や接種部位の腫脹がないことなど、体調に問題がないことを確認してから、接種してください。
- 特に医師が認めた場合、同時接種を行うことができます。
- **同一ワクチンを複数回接種する場合の接種間隔**については添付文書等の規定に従ってください。
5種混合 → 5種混合は20日以上、ロタ→ロタは27日以上などワクチンの種類、何回目の接種かによって接種間隔が異なります。接種スケジュールについて、訪問時に配布しているカレンダー、ワクチン毎のチラシでの確認や下記の連絡先にお問い合わせください。

参考) 予防接種ガイドライン2025年度版

- * 母子健康手帳の「予防接種」に関する情報、冊子「予防接種と子どもの健康」、町のワクチン毎のチラシも参考にしましょう。
- * 下線のあるワクチン（おたふくかぜ等）は**任意接種**になります。予防効果や副反応について十分御理解の上、接種を判断してください。
- * ご不明な点は、**保健福祉課保健係**（電話（0164）64 - 2215）へお問い合わせください。

