～1歳までの予防接種スケジュール～

～「定期接種」と「任意接種」～

定期接種：予防接種法に基づき市町村が実施します。対象となる疾病にかかりやすい時期を考慮して対象者が定められ、接種対象者（保護者）は接種を受けるよう努力する義務があります。

任意接種：定期接種以外の予防接種です。医療機関にて実施され、接種は接種対象者（保護者）の判断となります。

≪理想的な接種期間≫　＊早めにスケジュールを考え、接種できる時期になったら計画的に接種を進めていきましょう。分からない点などは気軽に保健師までご相談ください。（保健福祉課保健係　(0164)64-2215）

ワクチン名		種類	苫前町では 助成	苫前町では 通知	誕生	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	1歳
B型肝炎ウイルス	定期	不活化ワクチン	あり	なし			①	②					③				
ロタウイルス	定期	生ワクチン	あり	なし	1価		①	②									
					5価		①	②	③								
ヒブ	定期	不活化ワクチン	あり	なし			①	②	③								④
小児用肺炎球菌	定期	不活化ワクチン	あり	なし			①	②	③								④
四種混合（DPT-IPV）	定期	不活化ワクチン	あり	あり			①	②	③								④
五種混合（DPT-IPV-Hib）	定期	不活化ワクチン	あり	あり			①	②	③						④		
BCG	定期	生ワクチン	あり	あり						①							
MR（麻しん風しん混合）	定期	生ワクチン	あり	あり													①
水痘（みずぼうそう）	定期	生ワクチン	あり	なし													①-②
おたふくかぜ	任意	生ワクチン	あり	なし													①
※日本脳炎	定期	不活化ワクチン	あり	なし													

1回目から139日以上空ける

＊ロタ1価は、生後24週までに

ロタの1回目は生後14週6日までが望ましい

各ワクチンで予防できる病気やその内容について、**予防接種に関する小冊子など**もあわせてご確認ください。

※日本脳炎は生後6ヶ月以上13歳未満まで接種可能ですが、標準的な接種時期と接種回数は下記のとおりです。

Ⅰ期：3歳以上4歳未満（2回）Ⅰ期追加：4歳以上5歳未満（1回）Ⅱ期：9歳以上10歳未満（1回）　**計4回**

…定期接種対象年齢　…任意接種で接種可能年齢

←○→…標準的な接種時期（数字は接種回数）

≪予防接種の留意点≫

①熱が37.5℃以上のときは接種を控える

平熱には個人差があるので普段の平熱を知っておくようにしましょう。

②食事は30分前までに済ませておく

待合中に機嫌が悪くならないように、授乳や離乳食を済ませておきましょう。

③接種直後は病院で様子をみる

アナフィラキシーなど緊急に対応が必要な副反応は，接種後直ちに(30分以内)生じることが多いです。

④当日は家でゆっくり過ごす

帰り道に寄った先で風邪などが移ったり、興奮や疲れで体調を崩した場合、副反応との見分けがつかなくなってしまいます。

⑤接種後の期間にも注意

生ワクチンでは4週間（反応が出るまでの潜伏期間を含む）、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しておきましょう。

～副反応とは？～

接種部位が赤くなったり、熱が出たりする反応。

赤みや腫れは3～4日様子をみましょう。呼吸困難やショックなどの強い症状が出た場合はすぐ受診しましょう。

令和7年4月改編　保健福祉課保健係